

# Livret de liaison 1<sup>ère</sup>-Terminale pour la spécialité mathématique.

Les mathématiques sont une construction dont chaque étape est importante : afin de pouvoir comprendre et assimiler les nouvelles connaissances de terminale, il est indispensable de maîtriser le programme de 1<sup>ère</sup>.

Vous trouverez donc dans ce livret des exercices qui vous aideront à préparer votre entrée en terminale.

**Un corrigé est proposé à partir de la page 5 de ce document.**

Nous avons choisi de mettre l'accent sur **le second degré, les suites numériques, la dérivation et la fonction exponentielle.**

« En travaillant assidûment il faut peu de chose pour changer le médiocre en bon et le bon en excellent ».  
Gustave FLAUBERT

Un **contrôle de connaissance** de 1 heure constitué d'exercices semblables à ceux proposés dans ce livret aura lieu la deuxième semaine de la rentrée.



**Besoin d'aide ?** En plus de vos cours de 1<sup>ère</sup>, nous vous proposons aussi quelques **vidéos pouvant vous apporter de l'aide** pour faire les exercices de ce livret.

## SECOND DEGRE.



**Savoir :**

- résoudre une équation du second degré » : <https://www.youtube.com/watch?v=youUIZ-wsYk>
- étudier le signe d'un trinôme : <https://www.youtube.com/watch?v=v6fl2RqCCIE>
- étudier la position relative de 2 courbes : <https://www.youtube.com/watch?v=pT4xtI2Yg2Q>  
<https://www.youtube.com/watch?v=EyxP5HifyF4>

### Exercice 1 Savoir résoudre une équation du second degré (ou s'y ramenant).

1. Niveau 1 : Résoudre les équations suivantes

a)  $\frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{6}x - \frac{1}{12} = 0$

b)  $5x^2 + x + 4 = 0$

c)  $3x^2 - 4x - 1 = 2x - 4$

2. Niveau 2.

a) Résoudre l'équation  $\frac{-x^2 + 2x + 8}{2x + 4} = 0$

b) Montrer que, pour tout réel  $x$ , on a l'égalité :  $3x^4 + x^3 - 16x^2 - 5x + 5 = (x^2 - 5)(3x^2 + x - 1)$ .

Résoudre alors l'équation  $3x^4 + x^3 - 16x^2 - 5x + 5 = 0$ .

### Exercice 2 Résoudre un problème de degré 2.

Déterminer trois nombres entiers consécutifs, sachant que la somme des carrés de ces nombres est égale à 1 877.

### Exercice 3 Savoir étudier le signe d'un polynôme de degré 2 (trinôme).

Dans chacun des cas suivants, étudier le signe de  $f(x)$ .

1.  $f(x) = x^2 - 7x + 10$

2.  $f(x) = -6x^2 + x - 1$

### Exercice 4 Savoir étudier la position relative de deux courbes.

On considère les fonctions  $f$  et  $g$  définies sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -2x^2 + 4x + 3$  et  $g(x) = x + 4$ .

Etudier la position relative des courbes  $C_f$  et  $C_g$  représentant les fonctions  $f$  et  $g$ .

(on commencera par étudier le signe de  $f(x) - g(x)$ )



**Savoir :**

- dériver une fonction :
- étudier le sens de variations d'une fonction :
- déterminer une équation d'une tangente :
- lire graphiquement un nombre dérivé :

- <https://www.youtube.com/watch?v=9Mann4wOGJA>
- [https://www.youtube.com/watch?v=1f0GueiO\\_zk](https://www.youtube.com/watch?v=1f0GueiO_zk)
- <https://www.youtube.com/watch?v=OMsZNNIIdrw>
- [https://www.youtube.com/watch?v=-MfEczGz\\_6Y](https://www.youtube.com/watch?v=-MfEczGz_6Y)
- [https://www.youtube.com/watch?v=23\\_Ba3N0fu4](https://www.youtube.com/watch?v=23_Ba3N0fu4)
- <https://www.youtube.com/watch?v=bELc3OM9osQ>
- <https://www.youtube.com/watch?v=0jhxK55jONs>

**Exercice 5** Savoir dériver une fonction et étudier ses variations

Dans chacun des cas ci-dessous, où  $f$  est une fonction définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ , calculer la fonction dérivée de  $f$  et établir le tableau de variation de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

- $f(x) = 2x^3 - 2x^2 + 5x + 7$
- $f(x) = (x^2 + 1)(6x^2 - 10)$
- $f(x) = \frac{4x + 1}{2x^2 + 1}$

**Exercice 6** Savoir déterminer une équation de la tangente à une courbe


Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 4x + 1$  et  $C_f$  sa courbe représentative

- Déterminer, à la main une équation de la tangente  $T$  à la courbe  $C_f$  au point d'abscisse 3.
- Vérifier votre résultat en traçant, sur votre calculatrice, la tangente  $T$  et la courbe  $C_f$ .

**Exercice 7** Savoir lire un nombre dérivé et déterminer une équation de la tangente à une courbe (bis)

On donne, ci-contre, la courbe  $C_f$  d'une fonction  $f$  définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ , ainsi que ses tangentes  $T_A, T_B$  et  $T_C$  aux points  $A, B$  et  $C$  d'abscisses respectives 2, 1 et -1.

- Déterminer graphiquement :
  - $f(2), f(1)$  et  $f(-1)$ .
  - $f'(2), f'(1)$  et  $f'(-1)$ .
- En déduire une équation de chacune des tangentes  $T_A, T_B$  et  $T_C$ .



**Exercice 8**

**PARTIE A**


Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^3 - 60x^2 + 450x$ .

- Calculer  $f'(x)$  où  $f'$  désigne la dérivée de la fonction  $f$ .
- Etudier le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}$  puis en déduire le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

**PARTIE B**

Un fabricant envisage la production de boîtes pour emballer des clous en découpant deux bandes de même largeur dans une feuille de carton carrée de côté 30 cm.

On note  $x$  la mesure, en cm, de la largeur des bandes découpées.



- Expliquer pourquoi les valeurs prises par  $x$  appartiennent à l'intervalle  $]0 ; 15[$ .
- Soit  $V(x)$  le volume, en  $\text{cm}^3$ , de la boîte. Exprimer  $V(x)$  en fonction de  $x$ .
  - Vérifier que  $V(x) = 2x^3 - 60x^2 + 450x$ .
- Déterminer les dimensions de la boîte de volume maximal. Quel est ce volume maximal ?

**Savoir :**

- calculer les termes d'une suite :
- calculer les termes d'une suite avec Python :
- étudier une suite arithmétique :
- étudier une suite géométrique :
- calculer la somme des 1ers termes d'une suite avec Python.

<https://www.youtube.com/watch?v=HacflVQ7DIE>  
<https://www.youtube.com/watch?v=CYDUNYndHfg>  
<https://www.youtube.com/watch?v=6O0KhPMHvBA>  
<https://www.youtube.com/watch?v=6O0KhPMHvBA>  
<https://www.youtube.com/watch?v=WTmdtbQpa0c>  
<https://www.youtube.com/watch?v=gUkOjvAiZGA>  
<https://www.youtube.com/watch?v=3bwycUCtmg>

**Exercice 9** Savoir calculer les premiers termes d'une suite.

On considère les deux suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  définies sur  $\mathbb{N}$  par :  $u_n = 3n - 2$  et  $\begin{cases} v_0 = 2 \\ v_{n+1} = 3v_n - 2 \end{cases}$ .

1. Pour chacune de ces suites, calculer les quatre premiers termes.
2. On donne ci-dessous, le script Python d'une fonction permettant de calculer le terme de rang  $n$  de chacune de ces suites. Compléter cet algorithme :

```
>>> def u(n) :
    u = ...
    return(u)
```

```
>>> def v(n) :
    v = ...
    for i in range(1, n+1) :
        v = ...
    print(v)
```

**Exercice 10** Etude d'une suite arithmétique.

Soit  $(u_n)$  la suite arithmétique de 1<sup>er</sup> terme  $u_0 = 8$  et de raison  $r = 3$ .

1. Exprimer, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n$  en fonction de  $n$ .
2. Calculer  $u_{50}$ .
3. Calculer  $S = \sum_{k=0}^{50} u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_{50}$ .

**Exercice 11** Etude d'une suite géométrique.

Soit  $(u_n)$  la suite géométrique de 1<sup>er</sup> terme  $u_0 = 3$  et de raison  $q = 2$ .

1. Exprimer, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n$  en fonction de  $n$ .
2. Calculer  $u_9$ .
3. Calculer  $S = \sum_{k=0}^9 u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_9$ .

**Exercice 12**

Une entreprise de sécurité lance un nouveau système d'alarme. La première semaine, 2000 unités sont produites puis la production augmentera chaque semaine de 10%.

On désigne par  $u_n$  le nombre de systèmes fabriqués la  $n$ -ième semaine. On arrondira les résultats à l'unité.

1. Donner  $u_1$  puis calculer  $u_2, u_3$  et  $u_4$ .
2. Exprimer  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$  pour tout entier naturel  $n$ . Que peut-on en déduire pour la suite  $(u_n)$  ?
3. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
4. Calculer la production totale des 20 premières semaines.
5. L'entreprise souhaite savoir au bout de combien de semaine sa production totale aura dépassé 150 000 unités. Elle a donc écrit les deux fonctions Python ci-dessous. La première donne la somme des  $n$  premiers termes de la suite  $(u_n)$ . Compléter ces deux scripts afin que la 2<sup>e</sup> fonction indique à partir de quelle semaine la production totale sera supérieure ou égale à 150 000.

```
>>> def somme(n) :
    u = ...
    s = ...
    for i in range(1, n+1) :
        s = ...
        u = ...
    return(s)
```

```
>>> def seuil() :
    n = ...
    while ... :
        n = ...
    return(n)
```



- revoir les propriétés de exp : <https://www.youtube.com/watch?v=aD03wqgxexk&feature=youtu.be>
- étudier une fonction avec exp : <https://www.youtube.com/watch?v=MA1aW8ldjo&feature=youtu.be>

**Exercice 13** Savoir utiliser les propriétés algébriques de la fonction exponentielle.

Ici,  $x$  désigne un réel quelconque. Simplifier au maximum les expressions suivantes.

a)  $e^5 \times e^{-2} \times e^3$       b)  $(e^5 \times e^2)^4$       c)  $\frac{e^{-2 \times (e^3)^2}}{e^2}$       d)  $\frac{(e^x)^2 \times e^{x+1}}{e^{x-1}}$

**Exercice 14** Savoir résoudre une équation où apparaît la fonction exponentielle.

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

a)  $e^{x+2} < 1$       b)  $e^{5x+1} \geq e \times e^{2x}$       c)  $e^{(x^2)} = e$       d)  $(e^x - e^2)(e^{-x} + 5) = 0$

**Exercice 15** Savoir étudier une fonction où apparaît la fonction exponentielle.

On considère les trois fonctions  $f$ ,  $g$  et  $h$  définies sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = (5 - x)e^x \qquad g(x) = (e^x + 1)(e^x - 3) \qquad h(x) = \frac{x - 2}{e^x}$$

Pour chacune de ces fonctions, on demande :

- d'exprimer la dérivée en fonction de  $x$ .
- d'étudier le signe de la dérivée sur  $\mathbb{R}$ .
- de construire le tableau de variations de la fonction.
- de vérifier le tableau de variations en traçant la courbe de la fonction sur la calculatrice.

**Exercice 16** Savoir utiliser la formule permettant de calculer la dérivée de  $e^{ax+b}$ .

Le taux d'alcoolémie (en grammes par litre de sang) d'un homme de 70 kg après absorption de deux verres d'alcool à l'instant  $x = 0$  est donné, en fonction du temps  $x$  (en heures), par la fonction  $f$  définie sur  $I = [0 ; 4]$  par :

$$f(x) = 3xe^{-1,25x}.$$

- Montrer que pour tout  $x$  dans  $I$ , on a :  $f'(x) = (3 - 3,75x)e^{-1,25x}$ .
- Etablir le tableau de variation de  $f$  sur  $I$ .
- En déduire le nombre de minutes au bout duquel le taux d'alcool est maximal.

# Corrigé du livret de liaison 1<sup>ère</sup> → T<sup>le</sup> - Mathématiques

SECOND DEGRE.

## Exercice 1 Savoir résoudre une équation du second degré ou s'y ramenant

### 1. Niveau 1

- a)  $\frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{6}x - \frac{1}{12} = 0 \Leftrightarrow 8x^2 - 2x - 1 = 0$  est une équation de degré 2 (car forme  $ax^2 + bx + c = 0$  avec  $a = 8, b = -2, c = -1$ ) de discriminant  $\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 8 \times (-1) = 36$

$\Delta > 0$ , donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 - \sqrt{36}}{2 \times 8} = -\frac{1}{4} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 + \sqrt{36}}{2 \times 8} = \frac{1}{2} \quad \boxed{S = \left\{-\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right\}}$$

- b)  $5x^2 + x + 4 = 0$  est une équation de degré 2 de  $\Delta = 1^2 - 4 \times 5 \times 4 = -79$

$\Delta < 0$ , donc l'équation n'admet pas de solution dans  $\mathbb{R}$ .

$$\boxed{S = \emptyset}$$

- c)  $3x^2 - 4x - 1 = 2x - 4 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x + 3 = 0$  est une équation de degré 2 de  $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 3 \times 3 = 0$

$\Delta = 0$ , donc l'équation admet une solution (double) réelle :  $x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-6)}{2 \times 3} = 1$

$$\boxed{S = \{1\}}$$

**Remarque** On pouvait aussi remarquer que le calcul de  $\Delta$  n'était pas nécessaire ici :

$$3x^2 - 6x + 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

### 2. Niveau 2

- a)  $\frac{-x^2 + 2x + 8}{2x + 4} = 0$  équation « quotient nul » :  $\frac{A}{B} = 0 \Leftrightarrow A = 0$  et  $B \neq 0$

$$\Leftrightarrow -x^2 + 2x + 8 = 0 \quad \text{et} \quad 2x + 4 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -2 \quad \text{et} \quad x \neq -2$$

$$\begin{array}{l} -x^2 + 2x + 8 = 0 \text{ est une équation de degré 2} \\ \text{de } \Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times 8 = 36 \\ \Delta > 0, \text{ donc l'équation admet 2 solutions réelles distinctes :} \\ x_1 = \frac{-2 - \sqrt{36}}{2 \times (-1)} = 4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2 + \sqrt{36}}{2 \times (-1)} = -2 \end{array}$$

Finalement, l'équation  $\frac{-x^2 + 2x + 8}{2x + 4} = 0$  admet une seule solution dans  $\mathbb{R}$  : 4.

- b) Pour tout réel  $x$ ,  $(x^2 - 5)(3x^2 + x - 1) = 3x^4 + x^3 - x^2 - 15x^2 - 5x + 5 = 3x^4 + x^3 - 16x^2 - 5x + 5$ .

$$\text{Par suite, } 3x^4 + x^3 - 16x^2 - 5x + 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 5)(3x^2 + x - 1) = 0 \quad \text{équation « produit nul » : } A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 5 = 0 \quad \text{ou} \quad 3x^2 + x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\sqrt{5} \quad \text{ou} \quad x = \sqrt{5} \quad \text{ou} \quad x = x_1 \quad \text{ou} \quad x = x_2$$

$$\begin{array}{l} 3x^2 + x - 1 = 0 \text{ est une équation de degré 2} \\ \text{de } \Delta = 1^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 13 \\ \Delta > 0, \text{ donc l'équation admet 2 solutions réelles distinctes :} \\ x_1 = \frac{-1 - \sqrt{13}}{2 \times 3} = \frac{-1 - \sqrt{13}}{6} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-1 + \sqrt{13}}{2 \times 3} = \frac{-1 + \sqrt{13}}{6} \end{array}$$

Finalement, l'équation  $3x^4 + x^3 - 16x^2 - 5x + 5 = 0$  a pour ensemble solution :

$$S = \left\{-\sqrt{5}; \sqrt{5}; \frac{-1 - \sqrt{13}}{6}; \frac{-1 + \sqrt{13}}{6}\right\}$$

**Exercice 2** Résoudre un problème de degré 2

Soit  $n$  un entier quelconque.  $n - 1$ ,  $n$  et  $n + 1$  sont alors trois entiers consécutifs. Savoir que la somme des carrés de ces nombres est égale à 1 877 équivaut à :

$$\begin{aligned}(n - 1)^2 + n^2 + (n + 1)^2 &= 1\,877 \quad \text{soit} \quad n^2 - 2n + 1 + n^2 + n^2 + 2n + 1 = 1\,877 \\ &\Leftrightarrow 3n^2 = 1\,875 \\ &\Leftrightarrow n^2 = 625 \\ &\Leftrightarrow n = -25 \quad \text{ou} \quad n = 25\end{aligned}$$

**Les trois entiers consécutifs dont la somme des carrés est égale à 1 877 sont :  $-26, -25, -24$  ou  $24, 25, 26$ .**

**Remarque** En considérant les entiers consécutifs  $n, n + 1$  et  $n + 2$ , on obtient l'équation :

$$\begin{aligned}n^2 + (n + 1)^2 + (n + 2)^2 &= 1\,877 \quad \Leftrightarrow n^2 + n^2 + 2n + 1 + n^2 + 4n + 4 = 1\,877 \\ &\Leftrightarrow 3n^2 + 6n - 1\,872 = 0\end{aligned}$$

Cette dernière équation est de degré 2, son discriminant  $\Delta = 6^2 - 4 \times 3 \times (-1\,872) = 22\,500$   
 $\Delta > 0$ , donc **l'équation admet deux solutions réelles distinctes :**

$$n_1 = \frac{-6 - \sqrt{22\,500}}{2 \times 3} = -26 \quad \text{et} \quad n_2 = \frac{-6 + \sqrt{22\,500}}{2 \times 3} = 24$$

**On retrouve les deux triplets  $-26, -25, -24$  ou  $24, 25, 26$ .**

**Exercice 3** Savoir déterminer le signe d'un polynôme de degré 2

1.  $f(x) = x^2 - 7x + 10$  est un polynôme de degré 2 de  $\Delta = (-7)^2 - 4 \times 1 \times 10 = 9$

$\Delta > 0$ , donc  $f(x)$  admet deux racines réelles distinctes :  $x_1 = \frac{7 - \sqrt{9}}{2 \times 1} = 2$  et  $x_2 = \frac{7 + \sqrt{9}}{2 \times 1} = 5$ .

**$f(x)$  est donc du signe de 1 (coefficient de  $x^2$ ) sauf entre ses racines 2 et 5.**

$x$	$-\infty$	2	5	$+\infty$	
signe de $f(x)$	+	0	-	0	+

2.  $f(x) = -6x^2 + x - 1$  est un polynôme de degré 2 de  $\Delta = 1^2 - 4 \times (-6) \times (-1) = -23$

$\Delta < 0$ , donc  $f(x)$  n'admet pas de racine réelle.

**$f(x)$  est donc du signe de  $-6$  (coefficient de  $x^2$ ), autrement dit,  $f(x)$  est strictement négatif sur  $\mathbb{R}$**

**Exercice 4** Savoir étudier la position relative de deux courbes

On considère les fonctions  $f$  et  $g$  définies sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -2x^2 + 4x + 3$  et  $g(x) = x + 4$ .

$$f(x) - g(x) = -2x^2 + 4x + 3 - (x + 4) = -2x^2 + 3x - 1$$

$-2x^2 + 3x - 1$  est un polynôme de degré 2 de  $\Delta = 3^2 - 4 \times (-2) \times (-1) = 1$

$\Delta > 0$ , donc  $f(x) - g(x)$  admet deux racines réelles distinctes :  $x_1 = \frac{-3 - \sqrt{1}}{2 \times (-2)} = 1$  et  $x_2 = \frac{-3 + \sqrt{1}}{2 \times (-2)} = 0,5$ .

**$f(x) - g(x)$  est donc du signe de  $-2$  (coefficient de  $x^2$ ) sauf entre ses racines 0,5 et 1.**

$x$	$-\infty$	0,5	1	$+\infty$	
signe de $f(x) - g(x)$	-	0	+	0	-

**CONCLUSION**

- Sur  $] -\infty ; 0,5[ \cup ]1 ; +\infty[$ ,  $f(x) - g(x) < 0$  soit  $f(x) < g(x)$  et donc  $C_f$  est strictement en dessous de  $C_g$  ;
- sur  $]0,5 ; 1[$ ,  $f(x) - g(x) > 0$  soit  $f(x) > g(x)$  et donc  $C_f$  est strictement au-dessus de  $C_g$  ;
- sur  $\{0,5 ; 1\}$ ,  $f(x) - g(x) = 0$  soit  $f(x) = g(x)$  et donc  $C_f$  et  $C_g$  se coupent aux points d'abscisses 0,5 et 1.

**Exercice 5** Savoir dériver une fonction et étudier ses variations

**METHODE :** Pour étudier les variations d'une fonction, il suffit d'étudier le signe de sa dérivée.

1.  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^3 - 2x^2 + 5x + 7$

- Pour tout réel  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x) = 6x^2 - 4x + 5$
- $f'(x)$  est un polynôme de degré 2 de  $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 6 \times 5 = -104$   
 $\Delta < 0$ , donc  $f'(x)$  n'admet pas de racine réelle et est du signe de 6 (coefficient de  $x^2$ ) sur  $\mathbb{R}$ .  
 Finalement,  $f'(x)$  est strictement positif sur  $\mathbb{R}$  et donc  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

2.  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (x^2 + 1)(6x^2 - 10)$

- $f(x) = u(x)v(x)$  donc  $f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$  avec  $\begin{cases} u(x) = x^2 + 1 & \text{et } u'(x) = 2x \\ v(x) = 6x^2 - 10 & \text{et } v'(x) = 12x \end{cases}$

Ainsi, pour tout réel  $x$ ,  $f'(x) = 2x(6x^2 - 10) + (x^2 + 1)12x = 24x^3 - 8x = 8x(3x^2 - 1) = 8x(\sqrt{3}x - 1)(\sqrt{3}x + 1)$

- **Tableau de variation de  $f$  sur  $\mathbb{R}$**

$x$	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$+\infty$
signe de $8x$	-		0	+	+
signe de $3x^2 - 1$	+	0	-	0	+
signe de $f'(x)$	-	0	+	0	+
variation de $f$		$\swarrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

$3x^2 - 1$  est un polynôme de degré 2 qui s'annule en  $-\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$  et  $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .  
 $3x^2 - 1$  est donc du signe de 3 (coefficient de  $x^2$ ) sauf entre ses racines.

$f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \left(\frac{1}{3} + 1\right) \left(6 \times \frac{1}{3} - 10\right) = \frac{4}{3} \times (-8) = -\frac{32}{3}$  et  $f(0) = 1 \times (-10) = -10$

3.  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{4x + 1}{2x^2 + 1}$

- $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$  donc  $f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$  avec  $\begin{cases} u(x) = 4x + 1 & \text{et } u'(x) = 4 \\ v(x) = 2x^2 + 1 & \text{et } v'(x) = 4x \end{cases}$

Par suite, pour tout réel  $x$ ,  $f'(x) = \frac{4(2x^2 + 1) - (4x + 1)4x}{(2x^2 + 1)^2} = \frac{-8x^2 - 4x + 4}{(2x^2 + 1)^2}$

- Pour tout réel  $x$ ,  $(2x^2 + 1)^2 > 0$  et donc  $f'(x)$  est du signe de  $-8x^2 - 4x + 4$ .

Or,  $-8x^2 - 4x + 4$  est un polynôme de degré 2 de  $\Delta = (-4)^2 - 4 \times (-8) \times 4 = 144$

$\Delta > 0$ , donc  $-8x^2 - 4x + 4$  admet deux racines réelles distinctes :  $x_1 = \frac{4 - \sqrt{144}}{2 \times (-8)} = \frac{1}{2}$  et  $x_2 = \frac{4 + \sqrt{144}}{2 \times (-8)} = -1$

$-8x^2 - 4x + 4$  est donc du signe de  $-8$  (coefficient de  $x^2$ ) sauf entre ses racines  $-1$  et  $\frac{1}{2}$ .

**Tableau de variation de  $f$  sur  $\mathbb{R}$**

$x$	$-\infty$	-1	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
signe de $f'(x)$	-	0	+	0	-
variation de $f$		$\swarrow$	$\nearrow$	$\searrow$	

**Exercice 6** Savoir déterminer une équation de la tangente à une courbe


Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 4x + 1$  et  $C_f$  sa courbe représentative.

a) Une équation de la tangente à la courbe  $C_f$  au point d'abscisse 3 est :  $y = f'(3)(x - 3) + f(3)$

Or,  $f(3) = -2$  et, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x) = 2x - 4$  donc  $f'(3) = 2$ .

Par suite, une équation de la tangente est :  $y = 2(x - 3) - 2$  soit  $y = 2x - 8$

b) **A la calculatrice**, comme l'atteste le document ci-contre, il semble bien que la droite  $T$  soit tangente à la courbe  $C_f$  au point d'abscisse 3.



**Exercice 7** Savoir lire graphiquement un nombre dérivé.

1. a)  $f(2) = 2$ ,  $f(1) = 1$  et  $f(-1) = 5$

b) **Lorsque  $f$  est dérivable en  $x$ ,  $f'(x)$  est le coefficient directeur de la tangente à la courbe  $C_f$  de  $f$  au point d'abscisse  $x$  :**  $f'(2) = 2$ ,  $f'(1) = 0$  et  $f'(-1) = -4$ .

2.  $T_A : y = f'(2)(x - 2) + f(2)$  soit  $T_A : y = 2x - 2$

$T_B : y = f'(1)(x - 1) + f(1)$  soit  $T_B : y = 1$

$T_C : y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1)$  soit  $T_C : y = -4x + 1$

**Exercice 8**

□ **PARTIE A** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^3 - 60x^2 + 450x$ .

1.  $f'(x) = 2 \times 3x^2 - 60 \times 2x + 450 = 6x^2 - 120x + 450$


2.  $f'(x)$  est un polynôme de degré 2 de  $\Delta = (-120)^2 - 4 \times 6 \times 450 = 3\,600 = 60^2$

$\Delta > 0$ , donc  $f'(x)$  admet deux racines réelles distinctes :  $x_1 = \frac{120 - 60}{2 \times 6} = 5$  et  $x_2 = \frac{120 + 60}{2 \times 6} = 15$   
 $f'(x)$  est donc du signe de 6 (coef de  $x^2$ ) sauf entre ses racines 5 et 15.

• **Tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$**

$x$	$-\infty$	5	15	$+\infty$	
signe de $f'(x)$	+	0	-	0	+
variation de $f$					

□ **PARTIE B**



1.  $x$  désigne la mesure, en cm, de la largeur des bandes découpées, donc  $x > 0$ .

De plus,  $30 - 2x$  désigne la mesure, en cm, de la hauteur de la boîte, donc  $30 - 2x > 0$  soit  $15 > x$ .

**Les valeurs prises par  $x$  appartiennent donc bien à l'intervalle  $]0 ; 15[$ .**

2. a) Pour tout réel  $x$  tel que  $0 < x < 15$ , les dimensions de la boîte sont, en cm,  $30 - 2x$ ,  $15 - x$  et  $x$ .

**La mesure en  $\text{cm}^3$  du volume de la boîte est :  $V(x) = (30 - 2x)(15 - x)x$**

b)  $V(x) = (30 - 2x)(15 - x)x = (450 - 30x - 30x + 2x^2)x = 2x^3 - 60x^2 + 450x$  cqfd

3. La fonction  $V$  étant la restriction de la fonction  $f$  à l'intervalle  $]0 ; 15[$ , d'après la **partie A**, le volume  $V(x)$  est **maximal pour  $x = 5$** .

Les dimensions de la boîte de volume maximal sont donc 20 cm, 10 cm et 5 cm et le volume maximal est **égal à  $V(5) = 1\,000$  ( $\text{cm}^3$ )**.

**Exercice 9**

1. **La suite  $(u_n)$  est définie par son terme général.** Pour calculer le terme d'indice  $n$  de la suite, il suffit donc de remplacer  $n$  par sa valeur dans l'expression donnée :

$$\begin{aligned} u_0 &= 3 \times 0 - 2 = -2 & u_1 &= 3 \times 1 - 2 = 1 \\ u_2 &= 3 \times 2 - 2 = 4 & u_3 &= 3 \times 3 - 2 = 7 \end{aligned}$$

**La suite  $(v_n)$  est définie par récurrence.** Chaque terme d'indice  $n \geq 1$  de la suite est exprimé en fonction du terme précédent :

$$\begin{aligned} v_0 &= 2 & v_1 &= 3 \times v_0 - 2 = 3 \times 2 - 2 = 4 \\ v_2 &= 3 \times v_1 - 2 = 3 \times 4 - 2 = 10 & v_3 &= 3 \times v_2 - 2 = 3 \times 10 - 2 = 28. \end{aligned}$$

2. Pour calculer un terme de la suite  $(u_n)$ , il suffit d'utiliser une fois l'expression de la suite donnant le terme général de celle-ci. Pour calculer le terme d'indice  $n$  de la suite  $(v_n)$ , il faut utiliser  $n$  fois la formule de récurrence définissant la suite.

```
>>> def u(n) :
    u = 3*n-2
    return (u)

>>> def v(n) :
    v = 2
    for i in range(1, n+1):
        v = 3*v-2
    print (v)
```

**Exercice 10**

1. Pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_n = u_0 + nr = 8 + 3n$ .

2. Par suite,  $u_{50} = 8 + 3 \times 50 = 158$

$$\begin{aligned} 3. S &= \sum_{k=0}^{50} u_k = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{50} \\ &= u_0 + (u_0 + 3) + (u_0 + 3 \times 2) + \dots + (u_0 + 3 \times 50) \\ &= 51u_0 + 3(1 + 2 + \dots + 50) \\ &= 51 \times 8 + 3 \frac{50 \times 51}{2} \\ &= 4\ 233 \end{aligned}$$

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

**Remarque**

La somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique peut aussi être déterminée par la formule :

$$\text{Nombre de termes de la somme} \times \frac{\text{1er terme de la somme} + \text{dernier terme de la somme}}{2}$$

Soit ici,  $S = 51 \times \frac{8 + 158}{2} = 4\ 233$

**Exercice 11**

1. Pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_n = u_0 \times q^n = 3 \times 2^n$ .

2. Par suite,  $u_9 = 3 \times 2^9 = 1\ 536$

$$\begin{aligned} 3. S &= \sum_{k=0}^9 u_k = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_9 \\ &= u_0 + (u_0 \times 2) + (u_0 \times 2^2) + \dots + (u_0 \times 2^9) \\ &= u_0(1 + 2 + 2^2 \dots + 2^9) \\ &= 3 \frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} \\ &= 3 \times (2^{10} - 1) \\ &= 3\ 069 \end{aligned}$$

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  et tout réel  $q \neq 1$ ,  $1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

**Remarque**

La somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison  $q \neq 1$  peut aussi être déterminée

par la formule : 

$$\text{1er terme de la somme} \times \frac{1 - \text{raison}^{\text{nombre de termes de la somme}}}{1 - \text{raison}}$$

Soit ici,  $S = 3 \times \frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = 3\ 069$

**Exercice 12**

1. La première semaine, 2000 unités sont produites donc  $u_1 = 2000$ .

On sait qu'augmenter une quantité de 10% revient à la multiplier par  $(1 + \frac{10}{100}) = 1,1$  donc la 2<sup>e</sup> semaine, le nombre d'unités produites est  $u_2 = 1,1 \times u_1 = 1,1 \times 2000 = 2200$ .

De même,  $u_3 = u_2 \times 1,1 = 2200 \times 1,1 = 2420$  et  $u_4 = u_3 \times 1,1 = 2420 \times 1,1 = 2662$ .

2. En généralisant ce qui précède, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = 1,1 \times u_n$ .  
Ainsi, la suite  $(u_n)$  est une **suite géométrique de premier terme  $u_1 = 2000$  et de raison  $q = 1,1$** .

3. D'après le cours, pour tout entier naturel  $n \geq 1$ ,  $u_n = u_1 \times q^{n-1} = 2000 \times 1,1^{n-1}$ .

4. La production totale au cours des 20 premières semaines est  $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{20}$ . Cette somme est la somme des 20 premiers termes de la suite géométrique  $(u_n)$  donc :

$$S = \text{premier terme} \times \frac{1 - \text{raison}^{\text{nombre termes}}}{1 - \text{raison}} = u_1 \times \frac{1 - q^{20}}{1 - q} = 2000 \times \frac{1 - 1,1^{20}}{1 - 1,1} = 20000(1,1^{20} - 1) \approx 114550.$$

Au bout de 20 semaines, l'entreprise aura donc produit environ 114550 alarmes.

5. **Pour compléter le script de la fonction somme**, on commence par définir la suite  $u$  comme nous l'avons fait dans l'exercice 9. On initialise la valeur de  $u$  à 2000 :  $u = 2000$ , puis on définit la suite par récurrence :  $u = u \times 1,1$ .

On procède de la même façon pour définir la somme  $s$ . On initialise sa valeur :  $s = 0$ , puis on indique la relation qui permet de calculer la nouvelle somme :

*nouvelle somme = ancienne somme + valeur de la suite* soit  $s = s + u$ .

**Pour compléter le script de la fonction seuil**, il suffit de penser qu'il faut calculer les valeurs de  $\text{somme}(n)$  à partir de  $n = 0$ , tant que  $\text{somme}(n) < 150000$  (c'est-à-dire tant que la condition  $\text{somme}(n) \geq 150000$  n'est pas réalisée).

```
>>> def somme(n):
    u = 2000
    s = 0
    for i in range(1, n+1):
        s = s+u
        u=u*1.1
    return(s)

>>> def seuil():
    n = 0
    while somme(n)<150000 :
        n = n+1
    return(n)
```

**Remarque** Comme l'indique la capture d'écran ci-contre, la fonction *seuil*

indique  $n = 23$ , ce qui semble correct car :

$$\text{somme}(22) < 150000 < \text{somme}(23).$$

L'entreprise aura donc fabriqué plus de 150000 unités à partir de la 23<sup>e</sup> semaine.

```
>>> seuil()
23
>>> somme(22)
142805.49877367966
>>> somme(23)
159086.04865104763
```

 **FONCTION EXPONENTIELLE****Exercice 13** Savoir utiliser les propriétés algébriques de la fonction exponentielle.

- a)  $e^5 \times e^{-2} \times e^3 = e^{5+(-2)+3} = e^6$ .
- b)  $(e^5 \times e^2)^4 = (e^{5+2})^4 = (e^7)^4 = e^{7 \times 4} = e^{28}$ .
- c)  $\frac{e^{-2} \times (e^3)^2}{e^2} = \frac{e^{-2} \times e^{3 \times 2}}{e^2} = \frac{e^{-2+6}}{e^2} = e^{4-2} = e^2$ .
- d) Pour tout réel  $x$ ,  $\frac{(e^x)^2 \times e^{x+1}}{e^{x-1}} = \frac{e^{2x} \times e^{x+1}}{e^{x-1}} = e^{2x+(x+1)-(x-1)} = e^{2x+2}$ .

**Dans cet exercice, on n'utilise notamment les formules suivantes :**  
pour tout réel  $a$  et  $b$  et pour tout entier naturel  $n$ ,  
 $e^a \times e^b = e^{a+b}$   
 $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$   
 $(e^a)^n = e^{na}$ .

**Exercice 14** Savoir résoudre une équation où apparaît la fonction exponentielle.

a)  $e^{x+2} < 1 \Leftrightarrow e^{x+2} < e^0 \Leftrightarrow x+2 < 0 \Leftrightarrow x < -2$ .

L'ensemble des solutions de cette inéquation est donc  $S = ]-\infty; -2[$ .

b)  $e^{5x+1} \geq e \times e^{2x} \Leftrightarrow e^{5x+1} \geq e^1 \times e^{2x} \Leftrightarrow e^{5x+1} \geq e^{1+2x} \Leftrightarrow 5x+1 \geq 1+2x \Leftrightarrow 3x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0$ .

L'ensemble des solutions de cette inéquation est donc  $S = [0; +\infty[$ .

c)  $e^{(x^2)} = e \Leftrightarrow e^{(x^2)} = e^1 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } x = -1$ .

L'ensemble des solutions de cette équation est donc  $S = \{-1; 1\}$ .

d) On reconnaît une « équation produit nul » donc :

$$(e^x - e^2)(e^{-x} + 5) = 0 \Leftrightarrow e^x - e^2 = 0 \text{ ou } e^{-x} + 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x = e^2 \text{ ou } e^{-x} = -5 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } e^{-x} = -5$$

L'équation n'admet aucune solution sur  $\mathbb{R}$  car la fonction exponentielle est une fonction à valeurs strictement positives.

L'ensemble des solutions de cette équation est donc  $S = \{2\}$ .

**Exercice 15** Savoir étudier une fonction où apparaît la fonction exponentielle.

On rappelle la dérivée la fonction *exp* est la fonction *exp* :  $\exp' = \exp$ .

**Etude de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = (5 - x)e^x$ .**

a)  $f = u \times v$  donc  $f' = u'v + uv'$  avec  $\begin{cases} u(x) = 5 - x \text{ et } u'(x) = -1 \\ v(x) = e^x \text{ et } v'(x) = e^x. \end{cases}$

Donc pour tout réel  $x$ ,  $f'(x) = -1e^x + (5 - x)e^x = e^x(1 + 5 - x) = e^x(4 - x)$ .

b) Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$  donc  $f'(x)$  est du signe de  $4 - x$ .

c) Ainsi, le tableau de variations de la fonction  $f$  est :

$x$	$-\infty$	$4$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$0$	$-$
$f$			

$$f(4) = (5 - 4)e^4 = e^4.$$

**Etude de la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $g(x) = (e^x + 1)(e^x - 3)$ .**

a)  $g = u \times v$  donc  $g' = u'v + uv'$  avec  $\begin{cases} u(x) = e^x + 1 \text{ et } u'(x) = e^x \\ v(x) = e^x - 3 \text{ et } v'(x) = e^x. \end{cases}$

Donc pour tout réel  $x$ ,  $g'(x) = e^x(e^x - 3) + (e^x + 1)e^x = e^x(e^x - 3 + e^x + 1) = 2e^x(e^x - 1)$ .

b) Pour tout réel  $x$ ,  $2e^x > 0$  donc  $g'(x)$  est du signe de  $e^x - 1$ .

Pour tout réel  $x$ ,  $e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$  et  $e^x - 1 > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Leftrightarrow x > 0$ .

c) Ainsi, le tableau de variations de la fonction  $g$  est :

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	$0$	$+$
$g$			

$$g(0) = (e^0 + 1)(e^0 - 3) = -4$$

**Etude de la fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $h(x) = \frac{x-2}{e^x}$**

a)  $h = \frac{u}{v}$  donc  $h' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$  avec  $\begin{cases} u(x) = x - 2 \text{ et } u'(x) = 1 \\ v(x) = e^x \text{ et } v'(x) = e^x. \end{cases}$

Donc pour tout réel  $x$ ,  $h'(x) = \frac{1e^x - (x-2)e^x}{(e^x)^2} = \frac{e^x(1-(x-2))}{e^{2x}} = e^{-x}(3-x)$ .

b) Pour tout réel  $x$ ,  $e^{-x} > 0$  donc  $h'(x)$  est du signe de  $3 - x$ .

c) Ainsi, le tableau de variations de la fonction  $h$  est :

$x$	$-\infty$	$3$	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	$0$	$+$
$g$			

$$h(3) = \frac{3-2}{e^3} = \frac{1}{e^3} = e^{-3}.$$

**Exercice 16** Savoir utiliser la formule permettant de calculer la dérivée de  $e^{ax+b}$ .

Le taux d'alcoolémie d'un homme est donné par la fonction  $f$  définie sur  $I = [0 ; 4]$  par :  $f(x) = 3xe^{-1,25x}$ .

a)  $f = u \times v$  donc  $f' = u'v + uv'$  avec  $\begin{cases} u(x) = 3x \text{ et } u'(x) = 3 \\ v(x) = e^{-1,25x} \text{ et } v'(x) = -1,25e^{-1,25x}. \end{cases}$

(La dérivée de  $x \mapsto e^{ax+b}$  est  $x \mapsto a \times e^{ax+b}$ )

D'où, pour tout réel  $x$  de l'intervalle  $I$ ,  $f'(x) = 3e^{-1,25x} + 3x \times (-1,25) \times e^{-1,25x} = e^{-1,25x}(3 - 3,75x)$

b) Pour tout réel  $x$  dans  $I$ ,  $e^{-1,25x} > 0$  donc  $f'(x)$  est du signe de  $3 - 3,75x$ .

$$3 - 3,75x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{3,75} \Leftrightarrow x = 0,8.$$

Ainsi, le tableau de variations de la fonction  $f$  est :

$x$	$0$	$0,8$	$4$
$f'(x)$	$+$	$0$	$-$
$f$			

$$f(0) = 3 \times 0 \times e^{-1,25 \times 0} = 0$$

$$f(0,8) = 3 \times 0,8 \times e^{-1,25 \times 0,8} = 2,4e^{-1}$$

$$f(4) = 3 \times 4 \times e^{-1,25 \times 4} = 12e^{-5}.$$

c) Le taux est donc maximal au bout de 0,8 heures 'est-à-dire au bout de **48 min** ( ar  $0,8 \times 60 = 48$ )